

POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: RR-119-24

Dato: 23. november 2024

Stillet af: Magnus Von Dreier (C)

Besvarelse udsendt den: 17. december 2024

Spiseforstyrrelser samt genindlæggelsesprocent

Spørgsmål:

Som opfølgning på drøftelse i Social- og Psykiatriudvalget ønskes følgende oplyst:

1. Hvor høj er genindlæggelsesprocenten for patienter indlagt med en spiseforstyrrelse?
2. Hvor høj er genindlæggelsesprocenten, når man sammenligner patienter der udskrives sig selv, inden forløbet er afsluttet sammenlignet med patienter som først blive udskrevet efter endt forløb?

Svar:

1. Hvor høj er genindlæggelsesprocenten for patienter indlagt med en spiseforstyrrelse?

Nedenstående tabel viser genindlæggelsesprocenten for patienter, indlagt med en spiseforstyrrelse for 2023 og 2024. Genindlæggelsesprocenten er beregnet ud fra, at patienten er blevet genindlagt inden for 30 dage efter udskrivelse.

Genindlæggelsesprocenten for patienter indlagt med en spiseforstyrrelse var i 2023 17,4 procent og foreløbig for 2024 er genindlæggelsen på 14,8 procent.

Data som er anvendt til udregning af procentsatsen, er blevet opdateret den 3. december 2024, og dermed er genindlæggelsesprocenten for 2024 ikke for et fuldt år.

Tabel: Genindlæggelsesprocenten for patienter indlagt med en spiseforstyrrelse.

Årstal	Genindlæggelsesprocent
2023	17,4
2024	14,8

Der er taget udgangspunkt i primære indlæggelser, hvor aktionsdiagnosen er registreret som spiseforstyrrelse. Det er vigtigt at bemærke, at aktionsdiagnosen ved en genindlæggelse ikke nødvendigvis vil dreje sig om en spiseforstyrrelse. Årsagen til genindlæggelsen kan være anden psykisk sygdom end spiseforstyrrelse som f.eks. depression.

2. Hvor høj er genindlæggelsesprocenten, når man sammenligner patienter, der udskrives sig selv, inden forløbet er afsluttet, sammenlignet med patienter som først bliver udskrevet efter endt forløb?

Der eksisterer ikke en registrering i Sundhedsplatformen, som indikerer, at patienten selv har valgt at afslutte sit forløb. Det er derfor ikke muligt at angive en procentfordeling, når man sammenligner patienter, der udskrives sig selv, inden forløbet er afsluttet, sammenlignet med patienter, som først bliver udskrevet efter endt forløb. En mulig metode for at afdække andelen af genindlæggelser, efter en patient har udskrevet sig selv, kunne være ved at gennemføre en journalaudit. Dette vil kræve gennemgang af patienternes journaler enkeltvis, hvilket er et omfattende arbejde.