

Akut gynækologi og obstetrik

Her og nu	Indenfor 6 timer	Mellem 6-24 timer	indenfor 48 timer
1. Akut sectio, grad 1 og 2 2. Post partum blødning 3. Livstruende intraabdominal eller vaginal blødning 4. Nekrotiserende fasciitis med hurtig og aggressiv fjernelse af nekrotisk væv	1. Sectio grad 3A (1 time) 2. Torkveret adnex, fertil patient 3. Ekstrauterin graviditet, hæmodynamisk påvirket patient (1 time) 4. Fødselsbristning, med pågående blødning 5. Postoperativ blødning, hæmodynamisk påvirket patient (1 time) 6. Spontan abort med blødning 7. Organdonation	1. Sectio grad 3B 2. Fødselsbristning uden blødning 3. Ekstrauterin graviditet, stabil patient 4. Torkveret adnex, ikke fertil patient 5. Postoperativ blødning, hæmodynamisk stabil patient	1. Hysterektomi/hysteroskopi pga transfusionskrævende blødningsforstyrrelse 2. Gynækologiske problemstillinger, der kræver kirurgi hos stabile patienter

Ved to lige hastende operationer fra forskellige specialer, er det anæstesen, der prioriterer rækkefølgen

Akut abdominal kirurgi

Her og nu	Indenfor 6 timer	Mellem 6-24 timer	Indenfor 48 timer
1. Livstruende blødning, cirk. ustabil pt. (gastrointestinal, intraperitoneal, traume, postop.) 2. Nekrotiserende bløddelsinfektion 3. Traume, penetrerende (mistanke om perf. organ)	1. AHA ptt. (4 timer) 2. Appendicitis acuta 3. GI blødning, pågående, cirk. stabil pt. 4. Cholangitis med sepsis 5. Fremmedlegeme i GI kanalen. 6. Pleuradræn 7. Perianal absces, febril pt. 8. Colonileus (sigm. volvulus, stenose mhp stentanl.) 9. Anastomoselækage	1. GI blødning, ikke pågående 2. Cholecystitis, febril pt. 3. Perianal absces 4. Second look 5. Hernier, irreponible(fedtindhold)	1. Cholecystektomi (afebril pt.), cholecystit/ophobede galdestensanfald 2. Sårskift/VAC skiftning 3. Cholangitis uden sepsis 4. Øvre GI obstruktion med stentanlæggelse 5. Hernier, reponible.

Ved to lige hastende operationer fra forskellige specialer, er det anæstesen, der prioriterer rækkefølgen

Akut ortopædkirurgi

Her og nu	Indenfor 6 timer	Mellem 6-24 timer	Indenfor 48 timer
1. Livstruende ekstremitets blødning 2. Store traumer med livstruende skader, herunder bækkenfraktur med pågående blødning 3. Traumer med ekstremitetstruende skader 4. Akut livstruende bløddelssinfektion 5. Nekrotiserende bløddelsinfektion med hurtig og aggressiv fjernelse af nekrotisk væv 6. Kompartmentsyndrom 7. Luksation af knæled	1. Akut purulent arthritis hos patienter med generelle infektionstegn 2. Alvorlige postoperative blødninger 3. Luksation i store ekstremitetssled med påvirkede neurovaskulære forhold 4. Åbent fraktur (grad III) 5. Fraktur med påvirkning af neurovaskulære forhold 6. Multitraume 7. Akut proteseinfektion hos patienter med tegn på sepsis 8. Akut postoperativ infektion hos patienter med tegn på sepsis 9. Organdonation	1. Åben fraktur 2. Ustabil fraktur i lange rørknogler 3. Hoftefraktur 4. Akutte forurenede traumatiske sår 5. Diabetisk fod med dyb infektion 6. Akutte ortopædkirurgiske infektioner 7. Stor åben sårskade 8. Akut nervedekompression	1. Ustabile frakturer i mindre rørknogler 2. Bækkenfraktur uden vaskulærpåvirkning 3. Rygfraktur uden neurologiske udfald 4. Havareret osteosyntese 5. Implantatsvigt 6. Overskæring af nerver og sener i ekstremitet 7. Proteseinfektion 8. Revision af sår herunder decubitus 9. Låst knæ 10. Akut spinal stenose 11. Gangræn på grund af iskæmi

Ved to lige hastende operationer fra forskellige specialer, er det anæstesen, der prioriterer rækkefølgen

Akut ØNH kirurgi

Her og nu	Indenfor 6 timer	Mellem 6-24 timer	48 timer
1. Blødning, næse: ukontrolleret, kraftig 2. Blødning, svælg/luftveje: kraftig eller påvirket respiration/cirkulation 3. Blødning, postoperativt: kraftig eller påvirket respiration/cirkulation 4. Fremmedlegeme, svælg/strube/luftvej: påvirket respiration 5. Infektion: Epiglottitis med åndedrætsbesvær og mistanke om absces 6. Infektion: abscess i mund/svælg/strube med påvirket respiration 7. Infektion: etmoidit med periorbital abscess og påvirket syn 8. Stridor 9. Traume, hoved-hals: stridor/respirationsbesvær 10. Traume, hoved-hals: orbitalt hæmatom med synspåvirkning 11. Ætsning, mund/svælg/luftvej: påvirket respiration 12. Larynxttraume med påvirket vejrtrækning 13. Traume: højenergi traume til ansigt medførende blødning i luftveje 14. Fremmedlegeme i øvre luftveje med påvirket respiration 15. Mastoiditis med intrakranial abscedering og/eller sinus tromboflebit 16. Periorbitalabsces 17. Hoved/hals cancer med akut blødning og/eller truet luftvej	1. Blødning, hoved-hals: mindre, ikke påvirket respiration/cirkulation 2. Fremmedlegeme, svælg/strube/luftvej: IKKE påvirket respiration 3. Ved akut synkestop, i mere end 24 timer, eller ved skarpe fremmedlegemer i øsofagus 4. Infektion: abscess i mund/svælg/strube, IKKE påvirket respiration 5. Infektion: Etmoidit med periorbital abscess, ikke påvirket syn 6. Infektion: mastoidit 7. Traume, ansigt/næse: septum hæmatom 8. Traume, hoved-hals: større bløddelskader, ikke påvirket respiration 9. Mindre postoperativ blødning efter operation i hoved/hals gebet uden påvirkning af respiration eller kredsløbsvirkning 10. Fremmedlegeme: Bronkier uden påvirkning af respiration 11. Traume: Sårskade med kontrolleret blødning fra hoved/hals gebet 12. Fremmedlegeme: Penetrerende læsion med resterende fremmedlegeme 13. Septumabsces 14. Mastoiditis med subperiostal absces 15. Tonsilhypertrofi med åndedrætsbesvær	1. Fremmedlegeme: næse, øre 2. Traume, ansigt/næse: ansigtsfraktur uden hæmatom (fraset ukompliceret næsefrakturer som ses ved praktiserende speciallæge) 3. Ætsning, mund/svælg/luftvej: ikke påvirket respiration 4. Abscess på hals/hoved der ikke truer vejrtrækningen	

Ved to lige hastende operationer fra forskellige specialer, er det anæstesen, der prioriterer rækkefølgen